



**HEMOPARASITICIDA
SOLUCION INYECTABLE
USO VETERINARIO**

Composición garantizada:

Cada 100 mL de **KUBIK**[®] SOLUCION INYECTABLE, Contiene:

Diaceturato de 4,4	
Diazoamino dibenzamidina	4,0 g
Oxitetraciclina	10,0 g
Antipirina	15,0 g
Cianocobalamina (B12)	0,0015 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

Indicaciones:

Esta indicado en el control y tratamiento de la anaplasmosis, (*Anaplasma marginale.*), Babesiosis (*B. bigémina, B. bovis, B. canis*) y Tripanosomiasis (*T.evansi, T. Vivax*) en Bovinos, Equinos y Perros. Otras indicaciones a criterio del médico veterinario.

Especies para las cuales es recomendado: Bovinos, equinos y perros

Modo de empleo

Dosis y vía de administración:

Se administra por vía intramuscular profunda, previa desinfección del sitio de la inyección.

Dosis y frecuencia de aplicación:

Se dosifica en los vacunos o equinos afectados a razón de 1 mL por cada 10 kg de peso. En equinos dividir la dosis y aplicarla en intervalos de 1 a 2 horas para evitar síntomas parecidos al cólico. Perros 1mL por cada 12 kg de peso. En bovinos y equinos se puede repetir la dosis a las 24 horas si la fiebre persiste o a criterio del médico veterinario.

Precauciones:

- Uso veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consérvese en sitio fresco y alejado de la luz.
- Venta bajo receta del médico veterinario.

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 22 días después de finalizado es tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 144 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

Presentación comercial:

Frasco Vidrio Ámbar tipo I por: 10 mL, 25mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL

Producto de ROTAM AGROCOLOMBIA S.A.S
Bogotá, D.C.

