


NEWPORT®

Etkili Madde: 50 gr/lf Lambda - cyhalothrin



**ROTAM**

Özellikleri:

- Kontakt ve mide yoluyla etkilidir.
- Ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
- Uygulamadan kısa bir süre sonra olan yağışlardan etkilenmez.
- EC formülasyonu ile kolay uygulanır.
- Uygun toksikolojik özelliklere sahiptir. Uygulayıcıya, çevreye ve tüketiciye güvenlidir.
- Ruhsatlı olduğu ürünlerde güvenlidir.

Formülasyon Şekli:

EC (Emülsiyon Konsantre) formülasyondur.

Etki Mekanizması:

Sentetik piretroit grubu ilaçlardandır. Bitkinin sinir sistemindeki sodyum kanallarını etkiler. Böylece böcek hızlı bir şekilde paralyze olup ölür. Geniş bir böcek türüne karşı etkilidir.



KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>) Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp</i>)	150 ml/da Larva ve yumurta 50 ml/da 50 ml/da Nimf ve ergin	7 gün
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml/100 L su larva	3 gün
Bağ	Salkım Güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	20 ml/100 L su larva	7 gün
Mısır	Koçan kurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i>) Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Bozkurt (<i>Agrotis spp</i>)	30 ml/da Larva 30 ml/da Larva 50 ml/da Larva	14 gün
Buğday	Süne (<i>Eurygaster integriceps</i>) Hububat horfumlı böceği (<i>Pachytychius hordei</i>) Ekin kambur böceği (<i>Zabrus spp</i>)	20 ml/da (1.-3. ve 4.-5. dönem nimf) 25 ml/da Ergin 50 ml/da Larva	14 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlinea</i>)	40 ml/da Larva ve ergin	3 gün
Domates	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 ml/da Larva	3 gün
Lahana	Yaprak güvesi (<i>Plutella maculipennis</i>)	25 ml/da Larva	3 gün
Şekerpancarı	Kalkan böcekleri (<i>Cassida spp</i>)	25 ml/da Nimf ve Ergin	3 gün
Zeytin	Zeytin Güvesi (<i>Prays oleae</i>) Çiçek nesli	15 ml/100 L su Larva	3 gün
Antepfıstığı	Yaprak Psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 ml/100 L su Nimf	3 gün
Soya	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	150 ml/da	3 gün
Fındık	Fındık kurdu (<i>Curculio nucum</i>)	50 ml/da Ergin	3 gün

* Son ilaçlama ve hasat arasındaki süre

** Üretim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

1 Akdeniz Bölgesi'nde kullanılmaz.

2 Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılır.

3 Sadece Ege Bölgesi'nde kullanılır.

