

## PreXion für 3D EXPLORER

Ein im Galopp weit ausgreifendes Pferd, dessen dynamische Bewegungen noch einmal durch Farbwischer unterstrichen werden – so bewirbt Dechra ein Mittel zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei Pferden. Mit dem Motiv zeigt der Hersteller dann auch gleich den gewünschten Gesundheitszustand des Tieres nach der Behandlung. Denn so bewegt sich nur ein Pferd, das keine Probleme im Muskel- und Skeletapparat hat.

**Novaquin®**  
Suspension für Pferde in zwei praktischen Größen  
mit dem Wirkstoff Meloxicam

**NEU**

**Novaquin® 15 mg/ml**  
Suspension zum Eingeben für Pferde / Suspension orale pour chevaux / Suspensie voor oraal gebruik voor paarden  
Meloxicam / Meloxicam  
125 ml

**Novaquin® 15 mg/ml**  
Suspension zum Eingeben für Pferde / Suspension orale pour chevaux / Suspensie voor oraal gebruik voor paarden  
Meloxicam / Meloxicam  
336 ml

**125 ml Flasche reicht 5 Tage** < **600 kg Pferd** > **336 ml Flasche reicht 14 Tage**

**Novaquin® 15 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde.** Wirkstoffe und sonstige Bestandteile: En enthält Wirkstoff Meloxicam 15 mg. Sonstige Bestandteile: Natriumacetat 1,75 mg, Gelatinekügelchen, weiche Süßholzwurzel zum Eingeben. **Anwendungsgebiete:** Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Pferden. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei blutigen oder katarrhalischen Stühlen. Nicht anwenden bei Pferden mit gastrointestinale Störungen wie Infektionen oder Hämorrhagien. Nicht anwenden bei Funktionsstörungen von Leber, Niere oder Nieren sowie bei Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Pferden, die jünger als 6 Wochen sind. **Nebenwirkungen:** In Einzelfällen wurden während der klinischen Studien die für nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAIDs) typischen Nebenwirkungen (wie Übelkeit, Diarrhö) beobachtet. Die Symptome waren reversibel. In sehr seltenen Fällen wurden Appetitlosigkeit, Lethargie, Bauchschmerzen und Übelkeit berichtet. In sehr seltenen Fällen können irreführende Reaktionen, die normalerweise durch falsche Verabreichung und/oder falsche Dosierung verursacht werden, beobachtet werden. Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert: Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren), zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung; Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren); gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren); selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren); sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfälle). **Wirkzeit:** Erste Dosis: 3 Tage. Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. **Verschreibungspflichtig. Zulassungsinhaber:** Le Vet Bioherb B.V., Wageningen 7, 3421 TV Oudezwaai, Niederlande. **DE-Vertrieb:** Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH, Hauptstraße 6-8, 88320 Aulendorf, Deutschland.

**Dechra**  
Veterinary Products

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH • D-88323 Aulendorf • [www.dechra.de](http://www.dechra.de)

## FaktenSchmied-Fazit:

Pferde in Bewegung – immer wieder schön anzusehen!