



INGREDIENTE ACTIVO: Materia orgánica + Potasio (K₂O)

CONCENTRACIÓN: Mezcla

FORMULACIÓN: MO ≥ 45.0% (p/p) + K₂O ≥ 17.0% (p/p)

REGISTRO SANITARIO: RSCO-052/IV/18

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: HAIGLO® es un producto que está formulado a base de extractos vegetales cuyo ingrediente funcional es el alginato de potasio altamente concentrado 100% soluble de fácil absorción y rápido efecto. Facilita la nutrición y la bioestimulación activando las funciones bioquímicas en las células, acelerando la fotosíntesis lo que repercute en el crecimiento y desarrollo de las plantas durante las etapas fenológicas críticas del cultivo. Se recomienda su aplicación en aspersión foliar y en el riego durante el ciclo del cultivo y cuando se presenten condiciones adversas por factores bióticos y abióticos (daño de plagas y enfermedades y/o condiciones climáticas adversas).

INCOMPATIBILIDAD:

Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, sin embargo cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS g/ha	RECOMENDACIONES
Chile, chile bell, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, berenjena, melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote, coliflor, brócoli.	200-400	Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera hacerla antes de la floración y las posteriores con un intervalo de 10 días entre cada una.
Papa	200-400	Realizar 2-3 aplicaciones foliares, la primera a los 65 días después de la emergencia y las posteriores con intervalos de 20 días entre cada una.
Cebolla, poro, cebollin, col, lechuga, rábano.	200-400	Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada una, iniciando cuando la planta tenga 5-6 hojas verdaderas.
Ornamentales y viveros	200-400	Realizar 3 aplicaciones foliares en desarrollo vegetativo, con intervalo de 10 días entre cada una.