

Produktübersicht und Auflagen Mais

	DANEVA™	OCEAL®	PRIMERO™
Wirkstoff per l/kg	Mesotrione 100 g	Dicamba 700 g	Nicosulfuron 40 g
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)	Wasserlösliches Granulat (SG)	Ölige Dispersion (OD)
Verpackung	5 l	1,5 kg	5 l
zugelassen in Kultur – Häufigkeit / Aufwandmenge / BBCH-Stadium			
Mais	1 x 0,75 l/ha	0,5 kg/ha; NA -16	1x 1,0 l/ha; 12-18
	1 x 1,0 l/ha		
	1 x 1,5 l/ha		
	2 x 0,75 l/ha im Splittingverfahren, Abstand von mindestens 14 Tagen		
Anwendungsbestimmungen			
Wartezeit	F	F	F
Bienengefährlichkeit	B4	B4	B4
Abstand zu Oberflächengewässern mit abdriftmindernder Technik (m)	NW 609-1 50%: *,75%: *,90%: * ohne abdriftmind. Technik 5m	NW 642-1: Es ist der länderspez. Mindestabstand einzuhalten	NW 605-1 mit abdriftmindernder Technik: 50%: 5m/ 75%: */ 90%: * NW606 - Standard ohne abdriftmindernde Technik: 5m
Abstandsauflagen zu Saumstrukturen**	NT 109: Unbehandelter Mindestabstand 5m + 20m mit 90 % Abdriftminderung zu behandeln	NT 103 Standard: 20m Mit 90% abdriftmindernder Technik: 0m	NT 103 Standard: 20m Mit 90% abdriftmindernder Technik: 0m
Saumstreifen bei Hangneigung > 2%	NW 705 5 m	----	NW706; 20m
Auflagen drainierte Flächen	----	----	----
sonst. Auflagen & Hinweise			
			NG326-1: max.45 g Nicosulfuron/ ha
			NG327: Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron.

Stand: Dezember 2018; Vor der Anwendung unbedingt die Angaben der jeweiligen Gebrauchsanleitung entnehmen

*= nur länderspezifischer Mindestabstand einzuhalten

**= nicht einzuhalten bei Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind, oder die Anwendung in einem Gebiet mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen erfolgt (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) oder wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt wurden